

Δισέλιδο Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΣΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

2015
100% = 4,1 εκατομμύρια ασθενείς

2030
100% = 5,7 εκατομμύρια ασθενείς

Πηγή: Neurology 2007

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οικονομική επιβάρυνση

ΗΠΑ (2010): 23 δις δολάρια
Αναμενόμενο κόστος το 2020: 50 δις δολάρια

Επικοινωνήστε μαζί μας
τηλεφωνικά: 2310 302020
μέσω mail: info@parkinsonofficial.gr
www.parkinsonofficial.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ **abbvie**

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

?

Η νόσος

Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί μία ενδύνη πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και υπολογίζεται ότι οι πάσχοντες, παγκοσμίως, ατέρευται σε 6.300.000 άτομα. Θεωρείται εκφυλιστική νόσος, στη οποία μελώνται τα επίνεφρα της υποσφαιρικής στον εγκέφαλο λόγω εκφυλισμού των μελανινικών, περιχάρησιν εγκέφαλο που παράγει τον σιγκκερμίνον των κεντρικών της μελανινικών ουσίας δεν είναι γνωστή, όμως στο 10% των ασθενών διαπιστώνεται κληρονομικότητα. Η ηλικία έναρξης της νόσου κυμαίνεται γύρω στα 60 έτη, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών.

Τα συμπτώματα

Η νόσος εκδηλώνεται, κατεξοχήν, με διαταραχή στις κινήσεις, όπως είναι η βραδύτητα στην κίνηση, η δυσκαμψία, ο τρόμος στην ηρεμία, η διαταραχή στη βάδιση και η διαταραχή στην ισορροπία. Η διαταραχή αυτή της κινητικότητας επηρεάζει διακοιλίες στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, η νόσος εκδηλώνεται και με μη κινητικά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, αοφρητικές διαταραχές, διαταραχές του ύπνου, γλωσσικές διαταραχές, δυσκοιλιότητα και διαταραχές από την ούρηση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται βαθμιαία, ευθιθέως από την μία μεριά του σώματος και καθώς η νόσος εξελίσσεται, επεκτείνονται και στην άλλη μεριά του. Σε κάθε ασθενή η συμπτωματολογία ποικίλει, όσον αφορά στην βαρύτητα των συμπτωμάτων και στον ρυθμό επιδείνωσής τους, ενώ μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις των συμπτωμάτων από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα.

Θεραπεία*

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
εμπειματική αντιμετώπιση με φάρμακα που αναπληρώνουν την έλλειψη υποσφαιρίνης

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Φυσικοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Χειρουργική παρέμβαση

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οικονομική επιβάρυνση

Στα **αρχικά στάδια** της νόσου απαιτείται φαρμακευτική αγωγή με απλά θεραπευτικά σχήματα (περίοδος χαμηλού κόστους)

Με την **πάροδο του χρόνου** εμφανίζονται διακυμάνσεις στη θεραπευτική απόκριση, ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από τη θεραπεία, επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου. Απαιτούνται σύνθετα θεραπευτικά σχήματα- παρεμβάσεις διαφόρων ειδικοτήτων (περίοδος υψηλού κόστους)

Συχνότητα εμφάνισης της νόσου

1% σε άτομα ηλικίας περίπου 60 ετών
2,5-5% σε άτομα άνω των 80 ετών

* Η φαρμακευτική αγωγή δεν καθυστερεί, ούτε σταματά την εξέλιξη της νόσου, βελτιώνει, όμως, αποτελεσματικά τα κινητικά συμπτώματα. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής έχει η φυσικοθεραπεία, ο χορός, η λογοθεραπεία, η σωστή διατροφή και η ψυχολογική υποστήριξη.